

Boratec

Bor etanolamine

Permbajtja:

Bor (B) i tretshem ne uje ne lidhje etanolamine: 15.4% w/v (11% w/w).
Formulimi: Leng i tretshem (SL).
Ngjyra: E verdhe.

EC FERTILIZER

PERMBAJTJA: 1 Lt
PESHA: 1.4 Kg

Made in Spain by

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain)
Tel.: +34 913 273 200



Distributor lokal i autorizuar :
AGROHELP SHPK, DURRES
TEL.: 0692055309



Data e prodhimit:
Lot No. :

Boratec eshte produkt me permbajtje te larte Bori per te korigjuar mungesen e ketij mikroelementi ne bime. Bimet qe vuajn nga mungesa se Borit i shfaqin simptomat ne fazat e voneshme te vegetacioni, duke e beret te pa efektshem nderhyrjen ne keto faza. Prandaj **Boratec** keshillohet te perdoret sa me heret ne vegetacion, perpara shfaqjes se shenjave te karences se BORIT.

Boratec eshte pregatitur posacerisht per trajtimet gjethore, prandaj per te siguruar absorbimin maksimal nga gjethet keshillohet te perdoret ne ate faze kur bimet jane ne zhvillimin e bujeshem te mases vegetative.

BOR – ETANOLAMINE; KOMBINIM ME EFEKTIVITET TE LARTE

ETANOLAMINA eshte nje agjent bashkeveprues i cili nxit thithjen e BORIT nga gjethet dhe qarkullimin e tij ne brendesi te bimes ne nje kohe te shpejte duke stimuluar proceset fiziologjike si :

- Nxit lulezimim, polenizimim dhe zhvillimim e frutave
- Rrit cilesine e frutave e vecanerisht aftesite magazinuese
- Stimulon rritjen vegetative si te rrenjeve ashtu edhe te gjethëve
- Rrit rezistencen ndaj semundjeve kepurdhore
- Tek frutrenjore rrit rezistencen e frutave nga kalbeziment, nga zgavrimi i frutit dhe shton permbajtjen e sheqerit.

DOZA E PERDORIMIT NE KULTURAT "BORDASHESE"

NE TRANGULL, PJEPER, SHALQIN: Kungulloret kane kerkesa te medhe per Bor. Bori transportohet kryesisht nepermjet ksilemes keshtu qe nuk egziston mundesia te transportohet nga gjethet e vjetra tek te rejat. Per kete arsye nevojiten trajtime te shpeshta me Bor sa here kemi vegetacion te ri. Shenjat e para te mungeses se borit ne kungullore dallohen tek gjethet e reja te cilat kane ngjyre te zbet ne anet e tyre. Sythat e majes ngelen te pa zhvilluar. Frutat formojne zbardhje ne forme dregezash te ngjashme me simptomat e infeksioneve nga trips, humbasin shijen dhe cilesine. Per kete arsye tek kungulloret kerkohe trajtime te shpeshta me Bor sa here kemi vegetacion te ri. Kjo garanton zhvillim normal te bimes, fruta te bolleshem dhe te pa deformuar.

NE DOMATE DHE SPECA: 1-2 lit/ha ne fazen e zhvillimit te bujeshem vegetativ.

LULESHTRYDHE: 1 lit/ha ne fillim te lulezimit per nxitjen e lidhjes se frutave

PEME FRUTORE: 1-2 lit/ha para lulezimit dhe pas lidhjes se frutit.

ULLIShte: 2-3 lit/ha e fraksionuar ne tre trajtime: Trajtimi i pare ne diferencimin e lules, trajtimi i dyte me cfaqjen e butonave lulore, trajtimi i trete pas lidhjes se kokres.

PANXHARSHEQERI: 6 lit/ha kur trajtojeme token ose 3 lit/ha me trejtime gjethore ne fazen e 3-4 gjethëve e deri mbylljen e reshtave.

JONXHE: 1.5-3 lit/ha me trajtime gjethore kur bima eshte ne zhvillim te bujeshem.

Ne te gjitha rastet e trajtimeve gjethore norma e ujit eshte 200-400 lit/ha ne vartesi te vegetacionit.

PERZIERJA: **Boratec** perzihet me gjithe pleherat gjethore dhe pesticidet me prejashtim te atyre qe cfqin reaksion acid. Ne rastet kur perzierja eshte e pa njohur duhet te bejme prova paraprake ne siperfaqe te vogla per te pare reagimin e bimesise.

KUJDES: PERZIEJENI MIRE PARA PERDORIMIT. Mbaheni larg arritjes prej femijeve. Mos ha, pi ose tymos duhan kur perdorni kete produkt. Ruajeni ne nje vend te fresket, te thate dhe te mbrojtur nga temperaturat ekstreme. Mbaheni vetem ne ene origjinale. Perdoreni produktin sipas udhезimeve te kesaj etikete. Ne rast dyshimi, ju lutem kontaktoni teknike te autorizuar. Perdoreni vetem ne raste nevojash te njohura. Mos tejkaloni normat dhe dozat e rekomanduara.



SQ03/2V01/0219