

Foltec K

0- 30-20

PLEH I LENGESEM ME PERMBAJTJE TE LARTE FOSFORI DHE POTASI

PERMBAJTJA

(ne perqindje peshe/peshe)

FOSFORI(P_2O_5) itretshem ne uje: 30% p/p (42% p/v)
POTASI(K_2O) itretshem ne uje: 20% p/p (28% p/v)

EC FERTILIZER

Permbajtja: 1 lit

Pesha neto: 1,4 kg

**T.C.I.S.A.**

Pol. Ind. Campollano, Avda. 1, Esquina C/F.
02007 Albacete. Spain

Distributor lokal i autorizuar :



AGROHELP SHPK, DURRES
TEL.: 0692055309/310

Foltec K eshte formulim i lenget dhe transparent me permbajtje te larte te FOSFORIT dhe POTASIT, i cili perdor si ne pleherimin gjethor ashtu edhe ne fertirigacion gjate ciklit vegjetativ ne pranvere dhe ne vjeshtë si dhe kur kushtet klimatike me lageshti te larte ajrore dhe tokoset favorizojne cfaqjen e vrugjeve dhe kalbezimeve te rrenjeve dhe qafave.

AVANTAZHET

- Rrit qendrueshmerine e bimeve ndaj faktoreve abiotik duke nxitur sintezën e komponimeve te cilat luajne rje rol paresor ne vetembrojjen e bimeve.
- Forcon rrenjet dhe qafen e rrenjeve ne bimet e reja duke i bere me te qendrueshme ndaj kushteve te pafavorishme nga kalbezimet e rrenjeve dhe qafave.
- Ne te gjitha kulturat parandalon kalbezimet e ndryshme te frutave te shkaktuara ne kushtet e nje lageshite te larte ajrore dhe rrit jetegjatimesine e tyre ne ruajtje.

DOZAT DHE MENYRAT E PERDORIMIT

Kulturat	Dozat	Menyra e perdorimit
NE TRAJTIMET GJETHORE		
Agrume, pemë frutore, hardhi	200-300 ml/hl	Alternohet me fungicidet e vrugut dhe kromes
Bostanore	200-300 ml/hl	Alternohet me fungicidet e vrugut
Domate	300 ml/hl	Alternohet me fungicidet e vrugut
Perime te tjera	150-200 ml/hl	Alternohet me fungicidet e vrugut
NE UJTJEN ME PIKA		
Agrume, pemë frutore, hardhi	3-9 lit/ha	Kryhen dy trajtime cdo 1 javë
Perime	3 lit/ha	Kryhen dy trajtime cdo 1 javë
Ne zona te lokalizuara	500 ml/lit. uje	Perdoret ne ne zonat e demtuara
Banjezim i fidanave	1.5 ml /lit. uje	Zhytet sistemi rrenjor 2-3 minuta

PERZIERJA

Foltec K perzihet me te gjitha plehrat dhe pesticidet qe perdoren normalisht ne bujqesi. Nuk duhet te perziehet me agrokimikatet me reaksiun alkaljin, vajrat minerale dhe me produkte me baze bakri. Ne rastet e trajtuar me produkte me baze bakri duhet te princi 15 dite per te ndryshe me Foltec K.

RUAJTA DHE PERKUJDESJE TE TJERA

Ruajeni larg arrijes prej femijave. Ne rast gjellitje kerkoni menjehere ndihmen e mjekut duke i treguar atij produktin. Eviton kontaktin me syte dhe lekuren. Ne rast kontakti luhuni me uje te bolleshem. Produkti eshte stable ne kushtet e temperatureve dhe presionit normal. Produkti nuk eshte i djegeshem(flakezes) Ruhet ne vende te thata e te fresketa ne temperature 50-300 C dhe i pa eksposuar nga rezet direkte te dielliit. Tunde shishen ne menyre energjike parpara perdorimit. Ne rast derdhjesh te produktit ne medjis, perthiheni ate me materiale absorbuuese si rere ose tallash dhe asjesoheni sipas regulave lokale ne fuqi. Produkti ruhet ne ambalazhe originale si dhe blihet per perdorim vetem nese tregetohet ne ambalazhe originale. Per me shum informacion konsultohuni me distributorin lokal.



SQ03/V01/1014

Data e prodhimit:
Numri i lotit:
Data e skadimit: 3 vjetë nga data e prodhimit.



KUJDËS