

Quelatec AZ Plus

PRODUKT PLEHËRUES BIMOR BAZUAR NE MIKROELMENTE

AKTIVIZUE I PROCESEVE ENZIMATIKE Mikrogranula te treteshme ne uje (WG)

PERMBAJTJA:

Hekur (Fe) i treteshem ne uje dhe i chelatuuar me EDTA: 6% w/w
Manganez (Mn) i treteshem ne uje dhe i chelatuuar me EDTA: 2.5% w/w
Zink (Zn) i treteshem ne uje dhe i chelatuuar me : 1.2% w/w
Copper (Cu) i treteshem ne uje dhe i chelatuuar me EDTA: 0.6% w/w
Boron (B)) i treteshem ne uje: 0.5% w/w
Molybdenum (Mo)) i treteshem ne uje: 0.4% w/w
Cobalt (Co) i treteshem ne uje dhe i chelatuuar me EDTA: 0.02% w/w
Amino acide te lira : 2% w/w
Azot total : 5.7% w/w
Stabiliteti i pH ne fraksionet e chelatuara : 4-7

Numri i regjistrimit :
1592 , Date 5/11/2020

PESHA 1 KG



Prodhuar:

T.C.I. S.A.

Pol. Ind. Campollano, Avda. 1, Esquina C/F.
02007 Albacete. Spain



Distributor lokal i autorizuar :
AGROHELP SHPK, DURRES
TEL: +355 692066310

Quelatec AZ Plus

Quelatec AZ Plus eshte nje kompleks ushqyes bimor i balancuar me aminoacide te lira dhe mikroushqyes esencila te cilet sebashku stimulojne aktivitetin enzimatik duke nxitur proceset biokimike e fiziologjike ne bime e duke optimizuar procesin jetesor te sajve ne teresi.

Quelatec AZ Plus nxit riaktivizimin dhe rritjen e bimeve pas daljes nga i ftohit i dimrit duke aktivizuar rezervat ushqyese dhe stimuluar nje reaksion te fuqishem te fotosintezes.

Quelatec AZ Plus eshte gjithashtu shum efikas kur perdoret para lulezimit duke rritur fertilitetin e polenit dhe lidhjen e frutave.

DOZA DHE MENYRA E PERDORIMIT

Perdorimi ne toke: 5-10 kg/ha para mbjelljes-trapjantimit, ose ne filim te ngritjes se fidanit.

Ne Hidroponi: 3-5 kg/1000 lit. uje (solucion baze), marim 1 lit. nga solucioni baze per 100 lit uje vadites. Dozat me te larta mund te perdoren gjate zhvillimit te vrulleshem te bimeve, kur temperatura jane te larta si dhe ne ditet e shkurtara me temperatura te uleta.

Ne ujitje me pika: 2-3 kg/ha cdo 7-10 dite gjate ciklit bimor kur kerkesat per ushqim jane maksimale.

Ne ushqimin gjethor : 0.5-1.5 kg/ha or 100-150 g/100 lit. duke e aplikuar me cfaqien e simptomave.

Ne perime: 3 x 75-100 g/100 lit. uje (3 x 0.25-1 kg/ha) ne intervale 10-15 ditore, duke filluar kur aparati gjithor eshte ne zhvillim maksimal

Ne peme frutore, agrume, vreshta, ullinj : 3 x 100 g/100 lit uje (3 x 0.5-1 kg/ha) para lulezimit dhe 0.5-1 kg/ha pas lidhjes se frutave.

Ne kultura gjethore dhe drithra: 3 x 1 kg/ha ne vellazerim, ngritje, kallezim.

Ne foragjere : 1-1.5 kg/ha pas cdo kositje.

Ne patate dhe kultura te tjera tuberoz : 4 x 1 kg/ha ne interval 7-10 ditore, duke filluar kur bima eshte 10 cm. Perdoret jo me pake se 500 lit uje/ha.

Ornamentale: 75-100 g/100 lit uje (0.25-0.5 kg/ha) me cfaqien e simptomave te para

UDHEZIME PER PERDORIMIN

Ne ushqimin gjethor ne pemet frutore mos perdorin Quelatec AZ Plus ne koncentrim me te larte se 100gr /100lit uje. Nuk perdoret si ushqim gjethor ne lulezim ose gjate periudhes se ndryshimit te ngjyres se frutit. Nuk perdoret si ushqim gjethor ne, kumbulla, dhe kajs. Sperkatni gjithmone ku gjethet jane pa lageshti. Solucioni sperkates pregatitet duke hedhur Quelatec AZ Plus gradualisht ne uje dhe duke e shoqeruar me perzierje deri sa granulat te treten plotesisht. Mos e perdorni te perzierje me produkte te tjera me baze EDTA gjere e cila shkakton rritje te pa nevojeshme te koncentrimit te chelateve EDTA.

PERZIERJA : Quelatec AZ Plus perzihet me te gjitha pleherat dhe pesticidet qe jane ne perdorim te gjere. Ne rast perzierjesh te pa verifikuara rekomandohet te kryhen prova paraprake ose kerkohet konsulence nga personel i kualifikuar dhe perfaqesuesit lokal te kompanise. Nese do te perzihet me Nitratin e Kalciumit ndiq kete rruge :

1. Mbushni tanku me uje. 2. Shtoni Quelatec AZ Plus. 3. Perziheni per 2-3 minuta.

4. Shtoni Nitro kalciumin. %Perziheni.

KUJDESI , TRAJTIMI DHE RUAJTJA E PRODUKTTI

Mbaheni produktin ne vende te sigurta dhe larag arrijtes prej femijëve. Mos hani, pini ose tymosni duhan gjate perdorimit. Magazinohet ne vende te freskëta e te thata duke shmangur temperaturat ekstreme. Perdoreni produktin sipas instruksioneve te kesaj etikete. Per paqartesi drjetojuni distributorit lokal.

PERGJEGJESITE: Rekomandimet dhe informacioni qe ju veme ne dispozicion bazohet ne nje varg provash eksperimentale dhe eksperiencen ne perdorim te gjere te ketij produkti. Faktoret e ndryshem qe mund te jene jasht kontrollit tone (perzierja me produkte te ndryshme, perdorimi ndryshe, kushtet e vecanta klimatike, e te tjera) duhet te vleresohen me shume kujdes. Informacionet e dhena ne kete etikete duhet te sherbejne si orjentuese , ne raste specifike duhet te behen adoptime ne perdorim ne vartesi te kushteve ne te cilat do te punohet.

Data e prodhimit:

Lot No. :

Data e skadimit: 4 vjete nga data e prodhimit.

SQ03/2V01/0316



8 435146 620171