

Quelatec Fe

**Hekur i treteshem i chelatuar me (EDTA) per parandalimin
dhe kurimin e karences se hekurit ne kultura te ndryshme bujqesore
Mikrogranula te treteshme ne uje (WG)**

PERMBAJTJA:

Hekur(Fe) : I treteshem ne uje dhe celatuar me EDTA : 13.2%
Stabiliteti i pH ne fraksionet e chelatuara : 4-7

EC FERTILIZER

PESHA 1 KG



Prodhuar:

T.C.I. S.A.

Pol. Ind. Campollano, Avda. 1, Esquina C/F.
02007 Albacete. Spain



Distributor lokal i autorizuar :
AGROHELP SHPK, DURRES
TEL: +355 692066310



Quelatec Fe

PERDORIMI :

QUELATEC Fe eshte formuluar posacerish per tu perdorur si ne toke i shoqeruar me pleherimin baze, ne hidroponi, ne sistemet e ushqimit me pika dhe si ushqim gjethor.

Aplikimi me pleherim baze : 4-8 kg para mbjelljes, trapjantimit ose me fillimin e rritjes se bimes.

Ne sistemet Hydroponike: Pregatitim ne fillim **solucionin baze** me 0.4-0.6 kg/1000 lit. uje. Perdoret 1 lit solucion baze ne 100 lit. uje vadites.

Ne ujitje me pika :

Peme frutore, agrume dhe ullinj : perdoret gjate ujitjeve te para 4-8 kg/ha e ndare ne 2-3 duar ne interval 2 javore.

Luleshtrydhe: perdoret gjate ujitjeve te para 4-8 kg/ha e ndare ne 2-3 duar ne interval 2 javore.

Perime: perdoret gjate ujitjeve te para 4-8 kg/ha e ndare ne 2-3 duar ne interval 2 javore.

Ne ushqimin gjethor : 1-1.5 kg/ha , me cfaqje e simptomave te para.

Perime, Luleshtrydhe: 75-100 g/100 L uje (2-5 g/m²) kur masa vegetative eshte ne zhvillim.

Peme frutore, Agrume, dhe Ullinj : 30-100 g/100 L uje (0.5-1 kg/ha) aplikohet para lulezimit dhe pas lidhjes se frutave. Ne agrume aplikohet edhe gjate shperthimit te vegetacionit te ri ne vere.

Kulturat gjethore : 3 x 1 kg/ha kur ka shenja te mungeses se hekurit.

Foragjere : 1-1.5 kg/ha kur ka shenja te mungeses se hekurit.

Patate dhe kultura te tjera tuberoze : 1-1.5 kg/ha kur ka shenja te mungeses se hekurit duke aplikuar minimumi 500 lit /ha uje.

Ornamentale: 10-25 g/100 lit. uje duke kryer 2-4 trajtime ne interval 7-10 me fillimin e ciklit vegetativ

Vreshtari : 2 x 1-1.5 kg/ha para lulezimit dhe 2 x 1-1.5 kg/ha pas lulezimit.

UDHEZIME PER PERDORIMIN

Ne ushqimin gjethor ne pemet frutore mos perdorin QUELATEC Fe ne koncentrim me te larte se 100gr /100lit uje. Nuk perdoret si ushqim gjethor ne lulezim ose gjate periudhes se ndryshimit te ngjyres se frutit.

Nuk perdoret si ushqim gjethor ne varietetet Golden (molle), kumbulla, dhe kajsi. Sperkatni gjithmone ku gjethet jane pa lageshti. Solucioni sperkates pregatitet duke hedhur QUELATEC Fe gradualisht ne uje dhe duke e shoqeruar me perzjerje deri sa granulat te treten plotesisht. Mos e perdorni te perzjerme me produkte te tjera me baze EDTA gje e cila shkakton rritje te pa nevojeshme te knocentrimit te chelateve EDTA.

PERZIERJA :

QUELATEC Fe perzihet me te gjitha pleherat dhe pesticidet qe jane ne perdorim te gjere me perjashtim te Nitrarit te Kalciumit, Mikroplehrave ne lidhje EDTA dhe produktet me reaksion acid. Ne rast perzjeresh te pa verifikuar rekomandohet te kryhen prova paraprake ose kerkohet konsulence nga personel i kualifikuar dhe perfaqesuesit lokal te kompanise.

KUJDESI , TRAJTIMI DHE RUAJTJA E PRODUKTTI

Mbaheni produktin ne vende te sigurta dhe larag arrijtes prej femijëve. Mos hani, pini ose tymosni duhan gjate perdorimit. Magazinohet ne vende te freskëta e te thata duke shmangur temperaturat ekstreme. Perdoreni sipas rekomandimeve te kasaj etikete dhe mos tejkaloni dozat e perdorimi.

PERGJEGJESITE: Rekomandimet dhe informacioni qe ju veme ne dispozicion bazohet ne nje varg provash eksperimentale dhe eksperiencen ne perdorim te gjere te ketij produkti. Faktoret e ndryshem qe mund te jene jasht kontrollit tone (perzjerja me produkte te ndryshme, perdorimi ndryshe, kushtet e vecanta klimatike, e te tjera) duhet te vleresohen me shume kujdes. Informacionet e dhena ne kete etikete duhet te sherbejne si orientuese , ne raste specifike duhet te behen adoptime ne perdorim ne vartesi te kushteve ne te cilat do te punohet.

Data e prodhimit:

Lot No. :

Data e skadimit: 4 vjete nga data e prodhimit.

SQ03/2V01/0316



8 435146 610318

Produkt i pershtateshem per tu perdorur ne Bujqesine Organike sipas
EC Regulation No. 834/2007 dhe 889/2008. Control ECOCERT SA F-32600.