

Set-flower

**PK 0-9-12 me permbajtje te larte te Borit dhe Molibdenit ,
pasuruar me Aminoacide te lira si elemente esencial per
nxitjen e lulezimit dhe frutifikimit ne te gjitha kulturat
bujqesore.**

PERMBAJTJA:

Fosfor (P_2O_5): 9,5%
Potas (K_2O): 12,6%
Bor (B): 8%
Molibden (Mo): 10%
AMINOACIDE TE LIRA 5%

**Numri dhe data e regjistrimit :
Nr. 265, date 10.05.2018**

**PESHA
12 KG (12 x 1 KG)**



Made in Spain by
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
C/ Alcalá, 498, 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain)
Tel.: +34 913 273 200



Distributor lokal i autorizuar :
AGROHELP SHPK, DËRRËS
TEL.: 0692055309/310

Set-flower

Set-flower është një zgjidhje për të përmirësuar lulezimin dhe lidhjen e frutit në të gjitha kulturat. Set-flower është një ushqim i gatshëm i fosforit dhe potasit i pasuruar me Bor dhe Molibden. Është 100% i tretshëm dhe me efikasitet të lartë absorbimi si nga gjethet ashtu edhe nga rrenjet. Përmbajtja në nivel të lartë e Borit dhe Molibdenit, e ben Set-flower të jetë një produkt ideal për parandalimin dhe korigjimin e mungesës së këtyre mikroelementeve të cilët, falë përmbajtjes në formulim edhe aminoacideve të lira, absorbohen, qarkullojnë dhe asimilohen nga bimët me lehtësi. Set-flower rekomandohet të përdoret në të gjitha kulturat përimore dhe frutore për të shtuar dhe nxitur lulërimin, mbijetën e polenit, fekundimin e lules, lidhjen dhe zhvillimin e frutit.

DOZAT DHE MËNYRA E PËRDORIMIT

Ne trajtimet gjethore

Në domate dhe perime të tjera, luleshtydrë: 30-40 gr/100 lit.ujë duke kryer 2-3 trajtime. Trajtimi kryhet para lulezimit dhe perseritet cdo 12-15 dite.

Në kulturat drufrutore ,vreshta, agrume, ullinj: 25-35 gr/100 lit.ujë. Kryhen 3 trajtime duke filluar para lulezimit, pas rënies së petaleve dhe lidhjes së frutit.

Në lule dhe bime ornamentale: 20-30 gr/100 Lit. uje duke filluar në fazat e para të vegjetacionit dhe perseritur cdo 15 dite.

Fertirrigacion

Në perime, luleshtydrë dhe lule: 1-1,5 kg/ha me 2-3 aplikime duke filluar para lulezimit e duke perseritur cdo 12-15 dite.

Në kulturat drufrutore ,vreshta, agrume, ullinj: 1,5-3 kg/ha me 2-3 aplikime duke filluar para lulezimit e duke perseritur cdo 12-15 dite.

PERZIERJA

Perzihet me të gjitha pleherat dhe pesticidet që janë në përdorim të gjere. Nuk rekomandohet të perzihet me vajra minerale dhe produkte me reaksion të fort alkalik. Në rast perzierjesh të pa verifikuar rekomandohet të kryhen prova paraprake ose kërkohej konsultencë nga personel i kualifikuar dhe përfaqësuesit lokal të kompanisë.

KUJDESI , TRAJTIMI DHE RUAJTJA E PRODUKUTIT

Mund të dëmtojë fertilitetin. Mund të dëmtojë fëmijën e palindur. Shkakton iritim serioz në sy. Përmban: Acid Boric, Tetrapotassium pyrophosphate. Merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Ky produkt përdoret pasi të jeni instruktuar mbi masat paraprake të sigurisë dhe të keni lexuar dhe kuptuar mirë ato. Vishni doreza mbrojtëse, veshje mbrojtëse, mbrojtës për sytë dhe fytyrën. Nëse ekspozohenindaj produktit ose shqetësohen: Merrni këshilla mjekësore. NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË: Shplani me kujdes sytë me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse janë të pranishme dhe nëse mundeni. Vazhdoni shplarjen. Ruheni në vende të sigurta. Asgjësoni mbetjet e produktit dhe enet mbajtëse në vende të autorizuar. «Produkt i përcaktuar për përdorues profesional». Mbani larg arrijtes prej fëmijëve. Mos ha, pi ose tymos duhan kur përdorni këtë produkt. Ruhet në vende të freskëta të thata dhe larg nga temperaturat ekstreme. Ruhet vetëm në enë origjinale. Përdoret sipas udhëzimeve në këtë etiketë. Në rastë paqartësie , ju lutem kontaktoni me specialiste të autorizuar.

PERGJEGJESITE: Rekomandimet dhe informacioni që ju veme në dispozicion bazohet në një varg provash eksperimentale dhe eksperiencën në përdorim të gjere të këtij produkti. Faktoret e ndryshëm që mund të jenë jashtë kontrollit tonë (perzierja me produkte të ndryshme, përdorimi ndryshe, kushtet e vecanta klimatike, e të tjera) duhet të vlerësohen me shumë kujdes. Informacionet e dhëna në këtë etiketë duhet të shërbejnë si orientuese , në rastë specifikë duhet të behen adoptime në përdorim në varësi të kushteve në të cilat do të punohet.

Data e prodhimit:
Lot No. :



8 435 146 615 580

SQ03/2V01/1016



I DEMSHEM