

USHQYES KRISTALOR ME PERMBAJTJE TË LARTË
FOSFORI ME MIKROELEMENTE TË ÇELATUAR ME EDTA



5 POUNDS
2.27 KG



AZOT TOTAL(N)	12.0%	Bor (B)	0.02%
NO3:	2.4%	Bakër (Cu)	0.05%
NH4:	9.6%	Hekur (Fe)	0.10%
FOSFOR(P205)	48.0%	Mangan (Mn)	0.05%
POTAS(K2O)	8.0%	Molybden(Mo)	0.0005%
Magnez(Mg)	0.025%	Zink (Zn)	0.05%

PRODHUAR & PAKETUAR NË
SHTETET E BASHKUARA TË
AMERIKËS NGA



HANOVER, PENNSYLVANIA
17331 U.S.A.

“EC FERTILIZER”

MAKROELEMENTET (NPK) te derivuar nga Potassium Nitrate, Ammonium Phosphate and Ammonium Sulfate.

MIKROELEMENTET : Magnesium, Bakri, Hekuri, Manganezi, Zinku jane teresisht te Çelatur me EDTA Chelate (Disodium Ethylenediamine Tetra Acetate Chelate). Bori derivon nga Sodium Borate. Molybdeni derivon nga Ammonium Molybdate.

PERDORIMI

SOL-U-GRO® eshte nje ushqyes bimor i formuluar posacerisht per nxitjen e zhvillimit te sistemin rrenjor, formimin e nje lulerie te shendeteshme, lidheshmeri te larte te frutave si dhe gjate zhvillimit te bujeshem kur bimet kane nevoje per nje ushqim te pasur me Fosfor te balancuar me Azot e Potas. Përdoret ne fazen e mbjelljes gjate trajtimiti te bimeve ne vendin e perhereshem si ushqyes gjethor ose me ujitje me pika si dhe gjate vegetacionit kur bimesia çfaq simptomat e karences se Fosforit.

DOZAT E PERGJITHESHME TE PËRDORIMIT: Ne ushqimin gjethor per te plotesuar programin normal te ushqimit rrenjor perdoret 200-400 gr/100 lit. uje. Ne trajtime zonale me pompe shpine përdoret 3 gr/lit.uje. Shtohet NU-FILM per te siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri ne masen e gjelber.

Ne ushqimin rrenjor me ujitje me pika perdoret 2-4 kg / dystem.

KOHA, NUMRI I TRAJTIMEVE DHE SHPESHTIA E TYRE : Ne pergjithesi rekomandohen 4-5 trajtime per sezon duke filluar ne fazat e hereshme kur zhvillohet sistemi rrenjor dhe fryhen sythat frutor. Trajtimet perseriten ne intervalin 7-10 dite. Numri dhe shpeshtia e trajtimeve eshte ne vartesi te nevojave per Fosfor, te kushteve klimatike dhe streseve te ndryshme (mungesa e lageshtis ne toke, temperaturat e larta, rreshjet e dendura dhe probleme fitopatologjike) te cilat zvogelojne aftesine e sistemit rrenjor ne pervehtesimin e Fosforit nga toka.

NE PERIME (Domate, Patëllixhanë, Specat, Shalqin, Pjepër, Laker, Sallatë, Rukol ne fushe dhe sera) :

Me ujitje ne brazden e mbjelljes se farave: Pregatitet nje solucon me perqendrim 200-400 gram **SOL-U-GRO** per 100 liter uje, ose 4 gramë për litër. Solucioni shperndahet në rreshtin e farës ose shtratin e farës dhe mbulohet me tokë. Përdoren 250 ml në çdo meter linear të rreshtit.

Para trajtimitit : Modulet e fidaneve zhyten per 2 minuta ne nje solucon 0.4%te **SOL-U-GRO®**.

Gjate trajtimitit te fidaneve ne vendin e perhereshem te kultivimit : Doza e perdorimit eshte 200-400 gram **SOL-U-GRO®** per 100 liter uje ose 2-4 gram për liter duke derdhur ½ litër solucon rreth rrënjëve të seicilës bimë duke e mbuluar lehtë me tokë. Ne rastin e perdorimit me sistemin e ujitjes me pika perdoret 2-4 kg per dystem. **Si ushqyes gjethor** gjate vegetacionit : Perdoret me doze 200-400 gr/100 lit uje.

NE PEME FRUTORE : Agrume , Vreshta, Ullinj, Molle, Pjeshke, Nektarine, Dardha, Kumbulla, Arra, drure decorative,etj.: **Gjate mbjelljes se fidanave frutor** : Doza e perdorimit : 500-700 gram **SOL-U-GRO** në 100 litra ujë, ose 5-7 gram për litër. Ne vartesi te madhesise se fidani përdorni 4-7 litra solucon për çdo pemë menjehere pas mbjelljes. **Si ushqyes gjethore:** **SOL-U-GRO®** perdoret 200-400 gram per 100 litra uje ose 5 deri në 10 kilogramë për hektar ne vartesi te volumit te kurores.

NE BIMET E ARAVE (Soje, Kikirik, Miser Grur,Theker,Tersher, Sorgum, Luledielli): **Si ushqyes gjethor** me normën 5-10 kg /ha.Trajtimet fillojne ne fazat e para te rritjes per zhvillimin e sistemit rrenjor.

PER KOREGJIMIN E MUNGESËS SE FOSFORIT NE TE GJITHA KULTURAT : Si ushqyes gjethor perdoret menjehere pasi bimet çfaqin simptomat e mungeses se Fosforit. Doza e perdorimit 200-400 gr/100 lit. uje si pjese plotesuese e programit normal te ushqimit rrenjor. Ne rastet e trajtimeve zonale me pompe shpine përdoret 3 gr/lit.uje. Shtohet NU-FILM per te siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri te soluconit sperkates ne masen e gjelber.

VEREJTJE PER PERDORIMIN : **Perpuethshmeria:** **SOL-U-GRO** perzihet me insekticidet dhe fungicidet te cilet jane në përdorim të gjerë ne Perimet, Frutat, Lulet dhe Bime Dekorative. **KUJDES:** **NUK** përdoret me përbërës Dinitro, Bordolezi pregatitur ne fushe, Polisulfure, NitroKalcium ose materiale shumë alkaline. Ne perzierje me produkte te tjera **SOL-U-GRO®** shtohet në rezervuarin e spërkatjes si përbërës i fundit. **SHENIM** : Përdorni këtë produkt në përputhje me praktikat e mira agronomike, të cilat përfshijnë përdorimin e pajisjeve sperkates cilesore per te garantuar mbulimin uniform te gjetheve. Mos trajtoni kur temperaturat janë shumë të nxehta. Trajtimet duhet të bëhen në temperature te moderuar, vone mbasdite dhe ne kushte te tjera mjedisore te zone , të cilat nga pervoja juaj garantojne efektivitetin e sperkatjes dhe rezultatin e deshiruar.

Duke qenë se **SOL-U-GRO®** perdoret jashte kontrollit tonë dhe duke pasur parasysh se ky produkt permban elemente rreziku për njerëzit, kafshët dhe bimësinë, ne nuk japim asnjë garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, për sa i përket efekteve negative ne njerez, kafshë dhe bimësi, kur ky produkt nuk përdoret në përputhje me udhëzimet siç thuhet në këtë etiketë.

RUAJTJA DHE MAGAZINIMI : Produkti ruhet ne ambalazhe origjinale, ne vende te fresketa dhe te thata ne temperature -5 / +50°C larg rezeve direkte te diellit. Periudha maksimale e ruajtjes ne keto konditat eshte e pa kufizuar. **MBAHENI LARG ARITJES PREJ FEMIJEVE.**

SOL-U-GRO® është markë e regjistruar e Miller Chemical & Fertilizer,LLC.

DISTRIBUTOR PER SHQIPERINE : AGROHELP SHPK
DURRES , CEL : 00355 692055 309/310

