

SYLENCO

SYLEN ENERGY VIVA


PRODUKT PLEHËRUES ORGANIK ME PERMBAJTJE TE EKSTRAKTIT TE ALGES *Ascophyllum nodosum* ME PRMBAJTJE TE LARTE TE GLICINES DHE BETAINES, AMINOACIDEVE TE LIRA DHE ACIDIT FULVIK

SYLEN ENERGY VIVA është biostimulant organik i rritjes se bimëve i formuluar posacerisht për tu përdorur në ato fazë të zhvillimit bimor kur bima kalon streset biologjike si ato të trapjantimit, lulezimit, lidhjes dhe zhvillimit sikurse edhe streset abiotike si temperaturat ekstreme (të larta dhe të ulëta) pH dhe Salinitetin e tokës. Përmirëson zhvillimin e flores mikrobiale; Nxiti mbirjen e farave dhe zhvillimin e sistemit rrenjor; Vepron si një chelator natyral për mikroelementet duke rritur disponueshmërinë e tyre në tokë; Redukton mbetjet e herbicideve dhe substancave toksike në tokë.

NE TRAJTIMET GJETHORE

KULTURA	Doza e Përdorimit l/ha ; cc/hl lit	Numri i Aplikimeve	Koha e Aplikimit
Kulturat fushor (drithra, miser, soje, etj)	2 L/ha (200 cc/hl)	2	Para vëllazimit (GS21); Lulezim 1 cm (GS30).
Patate	1.5-3 L/ha (150-300 cc/hl)	2	Formimi i tubreve; Tuberi në fillim të madhësisë maksimale (Bulking)
Domate, Kungullore, Luleshtrydhe dhe perim të tjera.	1.5-3 L/ha (150-300 cc/hl)	3-5	Pas trapjantimit; Para lulezimit; Pas formimit të frutit; Gjatë rritjes së frutit.
Peme frutore vresht, ullinj, agrume.	2-3 L/ha (200-300 cc/hl)	3-4	Me çelje të sythave ose lastareve të rinjë në agrume, ullinj dhe vreshta; Pas lidhjes së frutit; Gjatë rritjes së frutit; Pas vjeljes.

SPECIFIKIME	w/w	w/v
Azot total (N)	1.8 %	2.14 %
Oksid Potasi (K ₂ O), water soluble	6.5 %	7.73 %
Ekstakt i algave detare <i>A.Nodosum</i>	30.5 %	36.30 %
Lende Organike	26.5 %	31.54 %
Karbon Organik (C _{org})	13.0 %	16.00 %
Osmoregullator	11.9 %	14.16 %
Amino Acide	3.5 %	4.16 %
Fulvic Acid	1.3 %	1.55 %
Bor(B), i terteshem në ujë	0.05 %	0.06 %
Molybden (Mo), i terteshem në ujë	0.001 %	0.001 %
510 g/1kg of plant biostimulant		



PERDORIMI NE TOKE:

Përdoret me sistemet e ujitjes me pika 3 - 5 L/ha duke filluar pas transplantimit për perimet ose në fillim të aktivitetit të sistemit rrënjëor në pemët frutore. Përsëriten aplikimin 2-3 herë gjatë ciklit të rritjes. Kontaktoni kompaninë ose shpërndarësin e kompanisë për rekomandime më specifike www.sylenco.de

Përputhshmëria: Produkti është i pajtueshëm me shumicën e agrokimikateve dhe plehrave të përdorura. Rekomandohet të kryeni një shkallë të vogël testoni përpara se të vazhdoni. Gjithmonë lexoni etiketën e produktit partner përpara përzierjes.