

EXILIS

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE
RREGULLATOR I RRRITJES SË BIMËVE
LEXONI ME KUJDES ETIKETEN PARA PERDORIMIT

Lenda active : 20 g/litre 6-benzyladenine
Formulimi : Konsentrat I treteshem

EXILIS ESHTË NJË RREGULLATOR I RRRITJES SË BIMËVE I CILI
APLIKOHET NE RRALLIMIN E FRUTAVE NE MOLLE DHE DARDHE, DUKE
NDIKUAR INDIREKT NE RRRITJEN E MADHËSISË SË FRUTIT DHE
UNIFORMITETIN TE TYRE.

PERDORET GJITHASHTU NE FIDANISHTET E PEMEVE FRUTUORE SI
DHE PEMET QE NUK KANE HYRE ENDE NE PRODHIM PER NXITJEN E
DEGEZIMEVE LATERALE FRUTOR

Deklaratat e rrezikut

H412 I dëmshëm për jetën ujore me efekte afatgjata.

EUH401 Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin,
respektoni udhëzimet për përdorim.

Deklarata e masave paraprake

P273 Mos e shpërndani në mjedis.

P391 Mblidhni derdhjen.

P501 Asgjësoni produktin/enë në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare.

KUJDESI GJATE PERDORIMIT

PAJISJET: Aplikoni duke përdorur pajisje të kalibruar saktë në përputhje me
rregulloret kombëtare dhe praktikatat e mira bujqësore.

RUAJTJA: Mbajeni larg fëmijëve. Ruani në enë origjinale, të mbyllur fort në një
vend të mbyllur, të thatë dhe të freskët nën 23°C. Ruajtja duhet të jetë në
përputhje me rregulloret kombëtare.

MBROJTJA PERSONALE:

Kur përzieni ose aplikoni vishni veshje mbrojtëse, duke përfshirë doreza dhe
syze rezistente ndaj ujit. Në rast kontakti, lani lëkurën dhe sytë me shumë ujë.
Nëse gëlltitet jepni ujë ose qumësht për t'u holluar dhe telefononi një mjek.
Lani duart dhe lëkurën e ekspozuar para ngrënies dhe pas punës.

ASGJESIMI: Shpëlajeni trefish enën dhe shtoni tretësirën shpëlarëse në
rezervuarin e spërkatjes. Hidhni ose ricikloni kontejnerin bosh dhe të pastër
sipas rregullave kombëtare. Shmangni kontaminimin e çdo furnizimi me ujë
me enë kimike ose bosh.

NDIHMA E PARË

Largoni te aksidentuarin nga zona e rrezikut.

Në rast kontakti me lëkurën: Hiqni menjëherë të gjitha veshjet e kontaminuara dhe lagni lëkurën e prekur me sasi të bollshme uji. Më pas lajeni me sapun dhe ujë.

Në rast kontakti me syte: Nëse lënda hyn në sy, lajini menjëherë me ujë të bollshëm për të paktën 15 minuta.

Nëse thithet: Mbajeni ne vend të ngrohtë dhe në qetesi në një pozicion gjysmë të drejtë. Lironi rrobat.

Nëse gëlltitet: Shpëlajeni gojën. Telefononi QENDRËN E HELMIMIT ose mjekun.

Në çdo rast, nëse simptomat vazhdojnë ose nëse nuk ndiheni mirë, konsultohuni me një mjek dhe tregojini atij etiketën dhe/ose fletën e të dhënave të sigurisë.

Në rast helmimi te kafshëve, kontaktoni veterinerin tuaj.

PERDORIMI

KULTURA	QELLIMI	Doza (L/Ha)	Numri Aplikimeve	Intervali	Volumi ujit
Molle	Rallim frutash	3.75-7.5 L/ha*	Max. 2	3 dite	500 – 1000 l/ha
	Rritje te madhësisë së frutit				
Dardhe	Rallim frutash	5-7.5 L/ha*	1	Nuk aplikohet	1000 – 1500 l/ha
	Rritje te madhësisë së frutit				
Peme ne fidanishte	Nxitje te lastareve lateral	3 L/ha	4	7 dite	50 L/ha

*Doza maksimale vjetore është 7.5 L/ha

DOZAT DHE KOHA E APLIKIMIT NE RSTIN E RRALLIMIT

Në mollë: 3,75-7,5 L/ha (0,375 – 0,75 L/hL).

Në dardhë: 5-7,5 L/ha (0,5 – 0,75 L/hL).

Përshtatni dozën e EXILIS® duke marrë parasysh ndjeshmërinë e varietetit ndaj nxitësve kimikë të hollimit, prodhimit alternativ dhe prodhimit të frutave të vegjël.

Rekomandohet të kryhet një trajtim i vetëm kur frutat qendrore në pemët ne prodhim te plote (kanë një diametër 7-15 mm (15-21 ditë pas lulëzimit të plotë), në një gjendje vegjetacioni të plotë.

Përshtatni vëllimin e ujit me madhësinë e pemëve dhe vëllimin e tyre të vegjetacionit për të siguruar mbulim të mirë të gjetheve dhe frutave.

Spërkateni kur pritet që temperatura e ditës në ditët në vijim të jetë më e lartë se 15°C. Për një efikasitet të mirë, është e rëndësishme që temperatura mesatare e ditës në 3-5 ditë pas trajtimit të jetë mbi 15°C. Temperaturat e larta

(mbi 28°C) gjatë kësaj periudhe mund të shkaktojnë rrallim të tepruar. Mos e aplikoni EXILIS® nëse temperatura është nën 15°C.

Aplikimi në kushte të ftohta, të akullta ose të thata mund të shkaktojë reagim të dobët.

Doza maksimale: 7.5 L/ha/vit.

Ne fidanishtet e pemëve frutore

Exilis mund të përdoret për të përshpejtuar dhe rritur degëzimin në fidanishtet e pemëve frutore, në bimë që nuk janë ende në prodhim, në mënyrë që të marrin pemë me lastare anesore dhe të fuqishem.

Në fidanishten e pemëve (mollë, dardhë): 3 L/ha

Aplikohet kur bimët rriten në mënyrë aktive, kur lastari apikal është 7-8 cm i gjatë. Përsëriteni aplikimin çdo 7 ditë.

Numri maksimal i aplikimeve për sezon: 4.

Spërkatja duhet të drejtohet në pjesën apikale të udheheqesi kryesor.

Vëllimi i rekomanduar i spërkatjes është 50 L/ha. Rekomandohet kombinimi me SILWET GOLD.

EXILIS® është një rregullator i rritjes i bazuar në 6-benziladeninë, nga familja e citokininave, që përdoret për rrallimin e frutave të rinj në kultivimin e pemëve të mollës. Ai vepron në procese të ndryshme fiziologjike në bimë (duke përfshirë fotosintezën dhe frymëmarrjen), duke çuar në rritjen e konkurrencës për lëndët ushqyese midis frutave të rinj në zhvillim. Në këtë mënyrë, favorizohet heqja e frutave më pak të fuqishme. Përveç kësaj, 6-benziladenina gjithashtu vepron në shumëzimin e qelizave të frutave të rinj në formim. Kështu përmirëson potencialin e rritjes së frutave. Nëpërmjet këtij veprimi të dyfishtë të rrallimit dhe rritjes së numrit të qelizave në frutat e rinj, EXILIS® përmirëson madhësinë e frutave gjatë vjeljes.

VEREJTJE PER PERDORIMIN

Shtoni sasinë e kërkuar të Exilis në rezervuarin gjysmë të mbushur me spërkatës ndërsa trazoni. Mbushni rezervuarin dhe vazhdoni lëvizjen gjatë spërkatjes. Përdoreni solucionin spërkatës brenda 24 orëve.

Shpëlajeni rezervuarin me ujë të pastër dhe spërkateni në parcelën e trajtuar.

EXILIS® përdoret në kuadrin e një programi rallimi, në lidhje ose në sekuencë me rallues të tjerë ose me rallimin mekanik. Mos e përzieni EXILIS® me produkte ose plehra të tjerë fitofarmaceutikë.

NIDIKIMI NE EKOSISTEM : I demshem dhe me afat të zgjatur për organizmat ujore. Sp1 Mos e ndotni ujin me produktet ose enën e tij. Mos i pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujit sipërfaqësor. Shmangni kontaminimin nëpërmjet kanaleve të kanalizimeve nga fermat dhe rrugët.

Karenca: Nuk aplikohet.

Ruajtja dhe magazinimi: Ruajeni në vend të thatë të freskët, në ambalazhin origjinal, të mbyllur mirë larg fëmijëve dhe kafshëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Ruani në enë origjinale, të mbyllur fort në një vend të mbyllur, të thatë dhe të freskët nën 23°C. Ruajtja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.

KUSHTET E GARANCISË SË PRODUKTIT DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garanton që ky Produkt është në përputhje me specifikimet e treguara në këtë etiketë. FINE mohon të gjitha garancitë e tjera, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar.

Është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me këtë produkt. Dëmtimet në bimë, mungesa e performancës ose pasoja të tjera të padëshiruara mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet jonormale të motit, prania e materialeve të tjera, mënyra e aplikimit, përdorimi i produktit ndryshe (dhe jo në përputhje) me udhëzimet e kësaj etikete ose faktorë të tjerë, të cilat së bashku janë jashtë kontrollit të FINE ose të shitësit. Në këto kuader dhe në përputhje me sa me sipër, të gjitha rreziqe të tilla do të merren përsipër nga Blerësi.

Në tërheqim veçanërisht vëmendjen e Blerësit për faktin se rezultatet e rrallimit varen nga një sërë faktorësh të jashtëm si ndjeshmëria e varieteteve specifike të kulturave ndaj rrallimit kimik, si dhe tendencat varietale për mbajtjen dyvjeçare dhe prodhimin e frutave të vegjël. Faktorë të tjerë të rëndësishëm që përcaktojnë performancën e rrallimit janë kushtet e motit në kohën e aplikimit dhe periudhen menjëherë pas trajtimit, si dhe lulëzimi, pllenimi dhe fuqia e përgjithshme e pemës.

Përgjegjësia e FINE sipas kësaj etikete do të kufizohet në shumën e çmimit të blerjes ose, në zgjedhjen e FINE, në zëvendësimin falas të Produktit. FINE heq dorë nga çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që rezultojnë nga trajtimi ose përdorimi i këtij produkti.

Numri dhe data e regjistrimit: _____;

Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë:
Deri në 1 L, 5L, 10L, 20L

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Data e prodhimit: _____;

Data e skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje:
_____;

Lloji i ambalazhit bazë: Shishe COEX ose HDPE;

Emri dhe adresa e kërkuesit: Fine Agrochemicals LTD. Adresa: Hill End House, Whittington Worcester WR5 2RQ, Britani e Madhe;

Emri dhe adresa e prodhuesit: Fine Agrochemicals LTD. Adresa: Hill End House, Whittington Worcester WR5 2RQ, Britani e Madhe, Vendi i prodhimit
1. SCHIRM GmbH, Mecklenburger Strasse 229, D- 23568 Lübeck, Germany
2. Chemark Zrt., Peremarton gyártelep, 06/75. hrsz., HU-8182 Berhida, Hungary.